



NEFRECTOMÍAS PARCIALES CON MÁRGENES POSITIVOS: NUESTRA EXPERIENCIA.

MANZI OREZZOLI MP; URBINA PORTELA, A.P.; LOPES ALVES, J.B; MURGUI RODRÍGUEZ, M; FERRER LOPEZ, A.I; OLIVARES RUIZ DEL OLMO, J.A; MACHADO FERNÁNDEZ, G.A; RODRIGUEZ ROMERO, M.A; VARILLA VARILLA, CA; BRAVO FERNÁNDEZ M.I. SERVICIO DE UROLOGÍA. HOSPITAL SAN PEDRO DE ALCÁNTARA COMPLEJO HOSPITALARIO DE CÁCERES.

- 2 – 13 % de las nefrectomías parciales tienen márgenes positivos.
- Factores que influyen:
- Edad, comorbilidades, preservación imperativa (monorreno, tumores bilaterales), TNM.
- Actitud terapéutica incierta.

Realizamos estudio observacional retrospectivo descriptivo. Nefrectomías parciales realizadas en los últimos 10 años. 68 casos revisados, 9 NP con márgenes positivos

PACIENTE	EDAD	SEXO	ASA	LADO	SINTOMAS
1	46	Hombre	II	Derecho	No
2	69	Mujer	II	Izquierdo	No
3	69	Hombre	II	Derecho	No
4	58	Hombre	III	Derecho	SI
5	50	Hombre	III	Izquierdo	No
6	62	Hombre	III	Derecho	SI
7	64	Hombre	III	Derecho	SI
8	79	Hombre	I	Derecho	SI
9	77	Hombre	III	Derecho	SI

Factores del paciente

PACIENTE	TNM	HISTOLOGIA	FUHRMAN	LINFA	TAMAÑO
1	T1a	C. Claras y papilar	2	No	3 cm (3x2 y 2x3)
2	T1a	C. Claras	1	No	1,3 cm
3	No aplicable	Oncocitoma	No aplicable	No	3 cm
4	T1b	Ca papilar	2	No	5 cm
5	T1a	Cromofobo	2	No	2 cm
6	T1a	C. Claras	2	No	3 cm
7	T1a	Ca papilar	2	No	3 cm
8	T2b	C. claras	2	Si	3,3 cm
9	T1a	Ca papilar	2	Si	5,5 cm

Factores tumorales

- El % de NP con márgenes positivos en los últimos 10 años es del 13,23%.
- Tamaño medio de la lesión 3,3 cm.
- En nuestra muestra no parece influir el tipo tumoral. Sin embargo, la mayoría de lesiones eran T1a (66,6%), y Fuhrman predominante II (77%). 7 de los 9 casos eran masas en riñón derecho.
- Solo un paciente ha sido sometido a nefrectomía radical por sección total del tumor.
- Ningún paciente ha presentado progresión en el tiempo de seguimiento.

- La NR o la re-resección pueden conllevar a un sobret ratamiento, puesto que la positividad de los márgenes en PN no parece influir en la supervivencia.